

АрЦинкум

Қадоқланиши: 100 мл флакон.

Таркиби: кумуш нанозаррачалари - 10 мг/л, рух - нанозаррачаларининг 20 мг/л, дистилланган сув.

Чиқарилиш шакли: коллоид эритма.

Қўлланилишга кўрсатмалар:

- Патоген бактериялар, вируслар, замбуруғлар чакирувчи хасталиклар: ларингит, фарингит, трахеит, бронхит, пневмония, эмфизема; ангина, тонзиллит, ринит, гайморит, отит, мастоидит; стоматит, гингивит, пародонтоз, тиш кариеси;
- Иммуниет сустиги, иммуниет танқислиги;
- Таъм ва хид билиш қобилятининг йўқолиши, сурункали гастрит, ошқозон ва 12-бармоқли ичак яра касаллиги, колит, турғун қабзиятлар, дисбактериоз, холецистит, сурункали панкреатит;
- Пиелонефрит, цистит;
- Эркаклар ва аёллар жинсий қувватсизлиги, тестостерон ва сперма ишлаб чиқарилиши сустиги, простатит, бавосил, парапроктит, бепуштлик.
- Вагинит, вульвовагинит, кольпит, бачадон бўйин эрозияси, молочница, баланопостит, полипоз, тухумдонлар кистаси.
- Стрептококк, стафилококк, бактериал инфекциялар, айниқса уреаплазма, хламидия, микоплазма, токсоплазмоз, торч инфекциялар. Ҳомила ташлаш хавфи.
- Кўз гавхари ва тўр пардаси функционал ҳолатини пасайиши: катаракта, “шапқўрлик” хасталиги.
- 2 чи тип қандли диабет.
- Рухий тушқунлик, ваҳима, депрессия.
- Поливалентли аллергиялар.
- Фурункулёз, хуснбузар, нейродермит, дерматит, экзема, псориаз, куйиш, микоз.
- Дизентерия, ич терламаси, паратиф, Эпштейн-Барр синдроми, бруцеллёз, скарлатина, дифтерия.

Қўллаш усули ва дозалари:

Катталар – ичга истеъмол учун: даволанишни дастлабки 5 кун давомида 10 мл дан 3 маҳал, тил остида 2-3 дақиқа ушлаб туриб истеъмол қилинади, кейинчалик 5 мл дан 2 маҳал 1 ой.

Боалар: 2 -7 ёшда – 2,5 мл дан 1 маҳал, 7-14 ёшда – 5 мл дан 1- 2 маҳал, тил остида 2-3 дақиқа ушлаб туриб истеъмол қилинади.

Маҳаллий қўлланилиши: ванночка, спринцевания, микроклизма ва чайқаш илик (+30° С - + 35° С) ҳолатда.

Эслатма: истеъмол қилиш муддати ўртача 30-90 кун ёки мутахассис маслаҳатига кўра.

Қарши кўрсатмалар:

- Махсулотнинг таркибий қисмига индивидуал қаршилик;
- Икки ёшгача бўлган боалар;
- Ҳомиладорлик ва лактация даври.

Қўллашдан аввал йўриқнома билан танишинг ёки истеъмол қилишдан аввал даволовчи шифокор билан маслаҳатлашинг.

Махсулот рангсиз, хидсиз, кимёвий қўшимчаларсиз. Шифокор рецептсиз берилади.

Курук, ёруғликдан химояланган жойда, +5 ° дан +25° С гача бўлган ҳароратда сақлансин.

Хажми: 100мл ± 2 мл

Ишлаб чиқарувчи: ALKIMYOGAR FARM МЧЖ.

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳар, Сайилгоҳ 43 уй

Е-mail: info@alximik.uz Web: alximik.uz

Тел: +998 73 240 00 30 +998 99 401 30 00

АрЦинкум

Қадоқланиши: 100 мл флакон.

Таркиби: кумуш нанозаррачалари - 10 мг/л, рух - нанозаррачаларининг 20 мг/л, дистилланган сув.

Чиқарилиш шакли: коллоид эритма.

Қўлланилишга кўрсатмалар:

- Патоген бактериялар, вируслар, замбуруғлар чакирувчи хасталиклар: ларингит, фарингит, трахеит, бронхит, пневмония, эмфизема; ангина, тонзиллит, ринит, гайморит, отит, мастоидит; стоматит, гингивит, пародонтоз, тиш кариеси;
- Иммуниет сустиги, иммуниет танқислиги;
- Таъм ва хид билиш қобилятининг йўқолиши, сурункали гастрит, ошқозон ва 12-бармоқли ичак яра касаллиги, колит, турғун қабзиятлар, дисбактериоз, холецистит, сурункали панкреатит;
- Пиелонефрит, цистит;
- Эркаклар ва аёллар жинсий қувватсизлиги, тестостерон ва сперма ишлаб чиқарилиши сустиги, простатит, бавосил, парапроктит, бепуштлик.
- Вагинит, вульвовагинит, кольпит, бачадон бўйин эрозияси, молочница, баланопостит, полипоз, тухумдонлар кистаси.
- Стрептококк, стафилококк, бактериал инфекциялар, айниқса уреаплазма, хламидия, микоплазма, токсоплазмоз, торч инфекциялар. Ҳомила ташлаш хавфи.
- Кўз гавхари ва тўр пардаси функционал ҳолатини пасайиши: катаракта, “шапқўрлик” хасталиги.
- 2 чи тип қандли диабет.
- Рухий тушқунлик, ваҳима, депрессия.
- Поливалентли аллергиялар.
- Фурункулёз, хуснбузар, нейродермит, дерматит, экзема, псориаз, куйиш, микоз.
- Дизентерия, ич терламаси, паратиф, Эпштейн-Барр синдроми, бруцеллёз, скарлатина, дифтерия.

Қўллаш усули ва дозалари:

Катталар – ичга истеъмол учун: даволанишни дастлабки 5 кун давомида 10 мл дан 3 маҳал, тил остида 2-3 дақиқа ушлаб туриб истеъмол қилинади, кейинчалик 5 мл дан 2 маҳал 1 ой.

Боалар: 2 -7 ёшда – 2,5 мл дан 1 маҳал, 7-14 ёшда – 5 мл дан 1- 2 маҳал, тил остида 2-3 дақиқа ушлаб туриб истеъмол қилинади.

Маҳаллий қўлланилиши: ванночка, спринцевания, микроклизма ва чайқаш илик (+30° С - + 35° С) ҳолатда.

Эслатма: истеъмол қилиш муддати ўртача 30-90 кун ёки мутахассис маслаҳатига кўра.

Қарши кўрсатмалар:

- Махсулотнинг таркибий қисмига индивидуал қаршилик;
- Икки ёшгача бўлган боалар;
- Ҳомиладорлик ва лактация даври.

Қўллашдан аввал йўриқнома билан танишинг ёки истеъмол қилишдан аввал даволовчи шифокор билан маслаҳатлашинг.

Махсулот рангсиз, хидсиз, кимёвий қўшимчаларсиз. Шифокор рецептсиз берилади.

Курук, ёруғликдан химояланган жойда, +5 ° дан +25° С гача бўлган ҳароратда сақлансин.

Хажми: 100мл ± 2 мл

Ишлаб чиқарувчи: ALKIMYOGAR FARM МЧЖ.

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳар, Сайилгоҳ 43 уй

Е-mail: info@alximik.uz Web: alximik.uz

Тел: +998 73 240 00 30 +998 99 401 30 00

АрЦинкум

Упаковка: 100 мл флакон.

Состав: наночастицы серебра - 10 мг/л, наночастицы цинка 20 мг/л, дистиллированная вода.

Форма выпуска: коллоидный раствор.

Показания к применению:

- Заболевания, вызываемые патогенными бактериями, вирусами, грибами: ларингит, фарингит, трахеит, бронхит, пневмония, эмфизема, ангина, тонзиллит, ринит, гайморит, отит, мастоидит, стоматит, гингивит, пародонтоз, кариес зубов.
- Иммунодефицитные состояния.
- Снижение или отсутствие обоняния и осязания, хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, колит, запоры, дисбактериоз, холецистит, хронический панкреатит.
- Пиелонефрит, цистит.
- Снижение половой активности у мужчин и у женщин, простатит, геморрой, парапроктит. Бесплодие.
- Вагинит, вульвовагинит, кольпит, эрозия шейки матки, молочница, баланопостит, полипоз, киста яичников.
- Стрептококковая, стафилококковая, бактериальная инфекция, в том числе уреоплазма, хламидия, микоплазма, токсоплазмоз, торч инфекции. Угроза выкидыша плода.
- Катаракта, “куриная слепота”.
- Сахарный диабет 2 го типа.
- Стрессы, депрессия.
- Поливалентные аллергии.
- Фурункулёз, вульгарные угри, нейродермит, дерматит, экзема, псориаз, ожоги, грибковые поражения.
- Дизентерия, брюшной тиф, паратиф, Синдром Эпштейн-Барра, бруцеллёз, скарлатина, дифтерия.

Способы применения и дозы:

Взрослые – в первые 5 дней лечения по 10 мл 3 раза в день (проглотить, подержав 2-3 минуты под языком), в последующем по 5 мл 3 раза в день в течение 1 месяца.

Дети: 2 -7 лет – по 2,5 мл 1 раз в день,

7-14лет – 5 мл дан 1- 2 раза в день под язык.

Местно - ванночки, спринцевания, клизмы и полоскания в теплом(+30⁰ C - + 35⁰ C) виде.

Напоминание: курс приёма 1- 3 месяца.

Противопоказания:

- Индивидуальная непереносимость к компонентам препарата;
- Дети до 2-х лет;
- Период беременности и лактации.

До приёма ознакомьтесь с инструкцией или посоветуйтесь с лечащим врачом.

Выдаётся без рецепта врача.

Хранить при температуре от +5 °C до +25 °C в сухом и в тёмном помещении

Объём: 100мл ± 2 мл

Производитель: ООО ALKIMYOGAR FARM.

Республика Узбекистан, город Фергана, ул. Сайилгох 43

E-mail: info@alximik.uz Web: alximik.uz

Тел: +998 73 240 00 30 +998 99 401 30 00

АрЦинкум

Упаковка: 100 мл флакон.

Состав: наночастицы серебра - 10 мг/л, наночастицы цинка 20 мг/л, дистиллированная вода.

Форма выпуска: коллоидный раствор.

Показания к применению:

- Заболевания, вызываемые патогенными бактериями, вирусами, грибами: ларингит, фарингит, трахеит, бронхит, пневмония, эмфизема, ангина, тонзиллит, ринит, гайморит, отит, мастоидит, стоматит, гингивит, пародонтоз, кариес зубов.
- Иммунодефицитные состояния.
- Снижение или отсутствие обоняния и осязания, хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, колит, запоры, дисбактериоз, холецистит, хронический панкреатит.
- Пиелонефрит, цистит.
- Снижение половой активности у мужчин и у женщин, простатит, геморрой, парапроктит. Бесплодие.
- Вагинит, вульвовагинит, кольпит, эрозия шейки матки, молочница, баланопостит, полипоз, киста яичников.
- Стрептококковая, стафилококковая, бактериальная инфекция, в том числе уреоплазма, хламидия, микоплазма, токсоплазмоз, торч инфекции. Угроза выкидыша плода.
- Катаракта, “куриная слепота”.
- Сахарный диабет 2 го типа.
- Стрессы, депрессия.
- Поливалентные аллергии.
- Фурункулёз, вульгарные угри, нейродермит, дерматит, экзема, псориаз, ожоги, грибковые поражения.
- Дизентерия, брюшной тиф, паратиф, Синдром Эпштейн-Барра, бруцеллёз, скарлатина, дифтерия.

Способы применения и дозы:

Взрослые – в первые 5 дней лечения по 10 мл 3 раза в день (проглотить, подержав 2-3 минуты под языком), в последующем по 5 мл 3 раза в день в течение 1 месяца.

Дети: 2 -7 лет – по 2,5 мл 1 раз в день,

7-14лет – 5 мл дан 1- 2 раза в день под язык.

Местно - ванночки, спринцевания, клизмы и полоскания в теплом(+30⁰ C - + 35⁰ C) виде.

Напоминание: курс приёма 1- 3 месяца.

Противопоказания:

- Индивидуальная непереносимость к компонентам препарата;
- Дети до 2-х лет;
- Период беременности и лактации.

До приёма ознакомьтесь с инструкцией или посоветуйтесь с лечащим врачом.

Выдаётся без рецепта врача.

Хранить при температуре от +5 °C до +25 °C в сухом и в тёмном помещении

Объём: 100мл ± 2 мл

Производитель: ООО ALKIMYOGAR FARM.

Республика Узбекистан, город Фергана, ул. Сайилгох 43

E-mail: info@alximik.uz Web: alximik.uz

Тел: +998 73 240 00 30 +998 99 401 30 00

