

НАНО СИЛВЕР

Қадоқланиши: 100 мл флакон.

Таркиби: кумуш нанозаррачалари - 10 мг/л, дистилланган сув.

Чиқарилиш шакли: коллоид эритма.

Қўлланилишга кўрсатмалар:

- Патоген бактериялар, вируслар чакирувчи касалликлар: трахеобронхит, ларингит, фарингит, бронхиал астма, пневмония, ангина, тонзиллит, ринит, гайморит, отит, мастоидит, стоматит;
- Сурункали гастрит, ошқозон ва 12 бармоқли ичак яра касаллиги, дуоденит, панкреатит ва сурункали холецистит;
- Иммуниетет сустлиги, иммуниетет танкислиги;
- Простатит, простата бези аденомаси, баланопостит, сурункали пиелонефрит ва цистит;
- Уретрит, бавосил, парапроктит, юқумли касалликлар билан боғлиқ бепуштлик,
- Вагинит, кольпит, бачадон бўйни эрозияси, тухумдонлар кистаси, TORCH инфекциялар ;
- Конъюнктивит, блефарит, говмичча.
- Танада сабаби аниқланмаган юқори ҳарорат;
- Фурункулез, хуснбузар, нейродермит, дерматит, экзема;

Қўллаш усуллари ва дозалари:

Катталар 6 ёшдан истеъмол учун 5 мл дан овқатдан 15-20 дақиқа олдин 2-3 маҳал.

Болалар 2-6 ёшгача: истеъмол учун 2,5 мл дан овқатдан 15-20 дақиқа олдин 2-3 маҳал.

Маҳаллий:

- Томоқни чайқаш: иссиқ эритма(+ 30-35 °С) билан оғиз ва томоқни чайқаш. Битта чайқаш давомийлиги 3-5 дақиқа.
- Ринит, синуситда 2-3 томчидан бир кунда 2-4 маҳал бурунга томизилади
- Ингальяция: +35-40 °С илиқ эритма билан 10-15 дақиқа давомийликда.
- Кўзга 2-3 томчидан бир кунда 3-4 марта томизилади
- Эритмага ботирилган тампон милк орқасига 3-5 дақиқага қўйилади.
- Овқат истеъмолидан сўнг ҳар сафар оғизни эритма билан чайиш лозим.
- Гинекологияда энг оддий усули – тампонни илиқ эритмага яхши ботириб қунига 2 маротаба қинга қўйиш, 10-12 кун давомида.
- Спринцевание: 10 мл шприц орқали эритма қинга 20-30 дақиқа давомида, 10-14 кун қўлланилади.
- Микроклизма –10 мл эритма 50 мл илиқ сувга ётишдан олдин тўғри ичакка (per rectum)

Қарши кўрсатмалар:

Маҳсулотнинг таркибий қисмига индивидуал қаршилиқ;

Маҳсулот рангсиз, ҳидсиз, кимёвий қўшимчаларсиз.

Шифокор рецептсиз берилади.

Қурук, ёруғликдан ҳимояланган жойда, +5⁰ дан +25⁰ С гача бўлган ҳароратда сақлансин.

Ҳажми: 100 мл ± 2 мл.

Ишлаб чиқарувчи: “**ALKIMYOGAR FARM**” МЧЖ.

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳар, Сайилгоҳ кўчаси, 43 уй

Е-mail: info@alximik.uz Web: alximik.uz

Тел: +998 73 240 00 30

+998 99 401 30 00

НАНО СИЛВЕР

Қадоқланиши: 100 мл флакон.

Таркиби: кумуш нанозаррачалари - 10 мг/л, дистилланган сув.

Чиқарилиш шакли: коллоид эритма.

Қўлланилишга кўрсатмалар:

- Патоген бактериялар, вируслар чакирувчи касалликлар: трахеобронхит, ларингит, фарингит, бронхиал астма, пневмония, ангина, тонзиллит, ринит, гайморит, отит, мастоидит, стоматит;
- Сурункали гастрит, ошқозон ва 12 бармоқли ичак яра касаллиги, дуоденит, панкреатит ва сурункали холецистит;
- Иммуниетет сустлиги, иммуниетет танкислиги;
- Простатит, простата бези аденомаси, баланопостит, сурункали пиелонефрит ва цистит;
- Уретрит, бавосил, парапроктит, юқумли касалликлар билан боғлиқ бепуштлик,
- Вагинит, кольпит, бачадон бўйни эрозияси, тухумдонлар кистаси, TORCH инфекциялар ;
- Конъюнктивит, блефарит, говмичча.
- Танада сабаби аниқланмаган юқори ҳарорат;
- Фурункулез, хуснбузар, нейродермит, дерматит, экзема;

Қўллаш усуллари ва дозалари:

Катталар 6 ёшдан истеъмол учун 5 мл дан овқатдан 15-20 дақиқа олдин 2-3 маҳал.

Болалар 2-6 ёшгача: истеъмол учун 2,5 мл дан овқатдан 15-20 дақиқа олдин 2-3 маҳал.

Маҳаллий:

- Томоқни чайқаш: иссиқ эритма(+ 30-35 °С) билан оғиз ва томоқни чайқаш. Битта чайқаш давомийлиги 3-5 дақиқа.
- Ринит, синуситда 2-3 томчидан бир кунда 2-4 маҳал бурунга томизилади
- Ингальяция: +35-40 °С илиқ эритма билан 10-15 дақиқа давомийликда.
- Кўзга 2-3 томчидан бир кунда 3-4 марта томизилади
- Эритмага ботирилган тампон милк орқасига 3-5 дақиқага қўйилади.
- Овқат истеъмолидан сўнг ҳар сафар оғизни эритма билан чайиш лозим.
- Гинекологияда энг оддий усули – тампонни илиқ эритмага яхши ботириб қунига 2 маротаба қинга қўйиш, 10-12 кун давомида.
- Спринцевание: 10 мл шприц орқали эритма қинга 20-30 дақиқа давомида, 10-14 кун қўлланилади.
- Микроклизма –10 мл эритма 50 мл илиқ сувга ётишдан олдин тўғри ичакка (per rectum)

Қарши кўрсатмалар:

Маҳсулотнинг таркибий қисмига индивидуал қаршилиқ;

Маҳсулот рангсиз, ҳидсиз, кимёвий қўшимчаларсиз.

Шифокор рецептсиз берилади.

Қурук, ёруғликдан ҳимояланган жойда, +5⁰ дан - +25⁰ гача бўлган ҳароратда сақлансин.

Ҳажми: 100 мл ± 2 мл.

Ишлаб чиқарувчи: “**ALKIMYOGAR FARM**” МЧЖ.

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳар, Сайилгоҳ кўчаси, 43 уй

Е-mail: info@alximik.uz Web: alximik.uz

Тел: +998 73 240 00 30

+998 99 401 30 00

НАНО СИЛВЕР

Упаковка: 100 мл флакон.

Состав: наночастицы серебра - 10 мг/л, дистиллированная вода.

Форма выпуска: коллоидный раствор.

Показания к применению:

- Болезни, вызываемые патогенными бактериями, вирусами: трахеобронхит, ларингит, фарингит, бронхиальная астма, пневмония, ангина, тонзиллит, ринит, гайморит, отит, мастоидит, стоматит;
- Хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки, дуоденит, хронический холецистит и панкреатит;
- Низкий иммунитет, иммунодефицитные состояния,;
- Простатит, аденома предстательной железы, баланопостит, хронический пиелонефрит и цистит;
- Уретрит, геморрой, парапроктит, бесплодие связанное с инфекционными заболеваниями;
- Вагинит, кольпит, эрозия шейки матки, киста яичников, TORCH инфекции ;
- Конъюнктивит, блефарит, ячмень;
- Высокая температура тела неясной этиологии;
- Фурункулёз, угри, нейродермит, дерматит, экзема;

Способы применения:

Взрослые с 6-лет: внутрь по 5 мл за 15-20 минут до еды 2-3 раза в день;

Дети от 2-х до 6 лет: внутрь по 2,5 мл за 15-20 минут до еды 2-3 раза в день;

Местно:

-Полоскание рта и горла тёплым раствором (+30-35°C).

Продолжительность одного полоскания от 3-до 5 минут.

-При рините, синусите закапывают в нос по 2-3 капли, 2-4 раза в день

-Ингаляция: Теплым раствором +35–40°C в течение 10–15 мин.

- По 2-3 капли в глаза 3-4 раза в день

-Тампон, смоченный в растворе, прикладывается к задней части десен на 3-5 минут.

- Полоскать рот раствором каждый раз после еды.

- В гинекологии: самый простой способ- хорошо смоченный тампон теплым раствором вводить во влагалище 2 раза в день, в течении 10-12 дней;

- Спринцевание: раствор вводят во влагалище с помощью 10

мл.го шприца на 20-30 минут, в течении 10-14 дней;

-Микроклизма –10 мл раствора смешивать с 50 мл теплой воды и вводить в прямую кишку перед сном. (per rectum)

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость.

Препарат без цвета, без запаха и химических примесей.

Отпускается без рецепта врача.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С в сухом и в тёмном помещении.

Объём: 100 мл ± 2 мл.

Производитель: ООО “ALKIMYOGAR FARM”.

Республика Узбекистан, город Фергана, улица Сайилгох, дом 43.

E-mail: info@alximik.uz Web: alximik.uz

Тел: +998 73 240 00 30

+998 99 401 30 00

НАНО СИЛВЕР

Упаковка: 100 мл флакон.

Состав: наночастицы серебра - 10 мг/л, дистиллированная вода.

Форма выпуска: коллоидный раствор.

Показания к применению:

- Болезни, вызываемые патогенными бактериями, вирусами: трахеобронхит, ларингит, фарингит, бронхиальная астма, пневмония, ангина, тонзиллит, ринит, гайморит, отит, мастоидит, стоматит;
- Хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки, дуоденит, хронический холецистит и панкреатит;
- Низкий иммунитет, иммунодефицитные состояния,;
- Простатит, аденома предстательной железы, баланопостит, хронический пиелонефрит и цистит;
- Уретрит, геморрой, парапроктит, бесплодие связанное с инфекционными заболеваниями;
- Вагинит, кольпит, эрозия шейки матки, киста яичников, TORCH инфекции ;
- Конъюнктивит, блефарит, ячмень;
- Высокая температура тела неясной этиологии;
- Фурункулёз, угри, нейродермит, дерматит, экзема;

Способы применения:

Взрослые с 6-лет: внутрь по 5 мл за 15-20 минут до еды 2-3 раза в день;

Дети от 2-х до 6 лет: внутрь по 2,5 мл за 15-20 минут до еды 2-3 раза в день;

Местно:

-Полоскание рта и горла тёплым раствором (+30-35°C).

Продолжительность одного полоскания от 3-до 5 минут.

-При рините, синусите закапывают в нос по 2-3 капли, 2-4 раза в день

-Ингаляция: Теплым раствором +35–40°C в течение 10–15 мин.

- По 2-3 капли в глаза 3-4 раза в день

-Тампон, смоченный в растворе, прикладывается к задней части десен на 3-5 минут.

- Полоскать рот раствором каждый раз после еды.

- В гинекологии: самый простой способ- хорошо смоченный тампон теплым раствором вводить во влагалище 2 раза в день, в течении 10-12 дней;

- Спринцевание: раствор вводят во влагалище с помощью 10

мл.го шприца на 20-30 минут, в течении 10-14 дней;

-Микроклизма –10 мл раствора смешивать с 50 мл теплой воды и вводить в прямую кишку перед сном. (per rectum)

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость.

Препарат без цвета, без запаха и химических примесей.

Отпускается без рецепта врача.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С в сухом и в тёмном помещении.

Объём: 100 мл ± 2 мл.

Производитель: ООО “ALKIMYOGAR FARM”.

Республика Узбекистан, город Фергана, улица Сайилгох, дом 43.

E-mail: info@alximik.uz Web: alximik.uz

Тел: +998 73 240 00 30

+998 99 401 30 00

