

НОРМОСТЕН

Қадоқланиши: 100 мл флакон.

Таркиби: рух нанозаррачалари 25 мг/л, магний нанозаррачалари 35 мг/л, табиий эфир мойи, дистилланган сув.

Чиқарилиш шакли: Коллоид эритма.

Қўлланилишга кўрсатмалар:

- Иммуниетет танқислиги;
- Таъм ва хид билиш қобилиятининг сусайиши, ошқозон ва 12-бармоқли ичак яра касаллиги, ичаклар моторикасини сустлиги, дисбактериоз;
- Сурункали колит, холецистит ва панкреатит, қабзият;
- Тестостерон ва сперма ишлаб чиқарилиши сустлиги, жинсий кувватсизлик;
- Простатит, бепуштлиқ, бавосил;
- Гипогонадизм: жинсий етилиш сустлиги ва бўй ўсмаслиги;
- Катаракта, “шапқўрлик” касаллиги;
- Қандли диабет 2 чи тип;
- Поливалентли аллергиялар;
- Фурункулёз, хуснбузар, дерматит, экзема, псориаз, куйиш, микоз;
- Дизентерия, ич терламаси, бруцеллёз, скарлатина;
- Мушак спазмлари ва талвасалари, мушаклар атрофияси;
- Уйқусизлик, руҳий тушқунлик, ваҳима, мигрень;
- Яллиғланган тери ва шиллик қаватлар тўқималарининг тез тикланишига ёрдам беради;
- Таянч-ҳаракат аппарати касалликлари: полиартрит, артроз, остеопороз, лат ейишлар ва травмаларда.

Қўлланилиши ва дозалари:

Катталар - 5 мл дан икки маҳал овқат вақтида истеъмол қилинади.

Болалар - 2-6 ёшгача 1,5-2 мл дан икки маҳал овқат вақтида, 6-12 ёшгача 2,5 мл дан 1-2 маҳал кунига.

Истеъмол қилиш муддати ўртача 1-3 ойгача ёки мутахассис маслаҳатига кўра.

Қарши кўрсатмалар:

- Маҳсулотнинг таркибий қисмига индивидуал сезувчанлик;
- Икки ёшгача бўлган болалар;
- Ҳомиладорлик ва эмизиклилик даври;
- Оғир буйрак етишмовчилиги;
- Гипотония;
- Леводопа препарати билан бир вақтда қўллаш мумкин эмас.

Шифокор рецептсиз берилади.

Сақланилиши: қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган жойда, +5°C дан +25°C гача бўлган ҳароратда сақлансин.

Хажми: 100 мл ± 2 мл

Дори воситаси эмас.

Ишлаб чиқарувчи: ALKIMYOGAR FARM МЧЖ.

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳар, Сайилгоҳ 43 уй.

Web: alximik.uz E-mail: info@alximik.uz

Тел: +998 73 240 00 30 +998 99 401 30 00

НОРМОСТЕН

Қадоқланиши: 100 мл флакон.

Таркиби: рух нанозаррачалари 25 мг/л, магний нанозаррачалари 35 мг/л, табиий эфир мойи, дистилланган сув.

Чиқарилиш шакли: Коллоид эритма.

Қўлланилишга кўрсатмалар:

- Иммуниетет танқислиги;
- Таъм ва хид билиш қобилиятининг сусайиши, ошқозон ва 12-бармоқли ичак яра касаллиги, ичаклар моторикасини сустлиги, дисбактериоз;
- Сурункали колит, холецистит ва панкреатит, қабзият;
- Тестостерон ва сперма ишлаб чиқарилиши сустлиги, жинсий кувватсизлик;
- Простатит, бепуштлиқ, бавосил;
- Гипогонадизм: жинсий етилиш сустлиги ва бўй ўсмаслиги;
- Катаракта, “шапқўрлик” касаллиги;
- Қандли диабет 2 чи тип;
- Поливалентли аллергиялар;
- Фурункулёз, хуснбузар, дерматит, экзема, псориаз, куйиш, микоз;
- Дизентерия, ич терламаси, бруцеллёз, скарлатина;
- Мушак спазмлари ва талвасалари, мушаклар атрофияси;
- Уйқусизлик, руҳий тушқунлик, ваҳима, мигрень;
- Яллиғланган тери ва шиллик қаватлар тўқималарининг тез тикланишига ёрдам беради;
- Таянч-ҳаракат аппарати касалликлари: полиартрит, артроз, остеопороз, лат ейишлар ва травмаларда.

Қўлланилиши ва дозалари:

Катталар - 5 мл дан икки маҳал овқат вақтида истеъмол қилинади.

Болалар - 2-6 ёшгача 1,5-2 мл дан икки маҳал овқат вақтида, 6-12 ёшгача 2,5 мл дан 1-2 маҳал кунига.

Истеъмол қилиш муддати ўртача 1-3 ойгача ёки мутахассис маслаҳатига кўра.

Қарши кўрсатмалар:

- Маҳсулотнинг таркибий қисмига индивидуал сезувчанлик;
- Икки ёшгача бўлган болалар;
- Ҳомиладорлик ва эмизиклилик даври;
- Оғир буйрак етишмовчилиги;
- Гипотония;
- Леводопа препарати билан бир вақтда қўллаш мумкин эмас.

Шифокор рецептсиз берилади.

Сақланилиши: қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган жойда, +5°C дан +25°C гача бўлган ҳароратда сақлансин.

Хажми: 100 мл ± 2 мл

Дори воситаси эмас.

Ишлаб чиқарувчи: ALKIMYOGAR FARM МЧЖ.

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳар, Сайилгоҳ 43 уй.

Web: alximik.uz E-mail: info@alximik.uz

Тел: +998 73 240 00 30 +998 99 401 30 00

НОРМОСТЕН

Упаковка: 100 мл флакон

Состав: наночастицы цинка - 25 мг/л, наночастицы магния - 35 мг/л, натуральные эфирные масла, дистиллированная вода.

Форма выпуска: коллоидный раствор.

Показания к применению:

- Иммунодефицитные состояния.
- Снижение обоняния и осязания, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, снижение перистальтики кишечника, дисбактериоз;
- Хронический колит, холецистит и панкреатит, запоры;
- Снижение выработки тестостерона и спермы, снижение половой функции.
- Простатит, бесплодие, геморрой.
- Гипогонадизм: отставание полового развития и роста;
- Катаракта, “куриная” слепота;
- Сахарный диабет 2 го типа;
- Поливалентная аллергия;
- Фурункулёз, угри, дерматит, экзема, псориаз, ожоги, микоз;
- Дизентерия, брюшной тиф, бруцеллёз, скарлатина, дифтерия;
- Спазмы мышц, судороги, атрофия мышц;
- Бессонница, депрессия, паника, мигрень;
- Способствует быстрому восстановлению воспаленных тканей кожи и слизистых оболочек;
- Болезни опорно-двигательного аппарата, полиартриты, артрозы, остеопороз, при ушибах и травм.

Способы применения и дозы:

Взрослые: по 5 мл 2 раза в день во время еды.

Дети: 2-6 года по 1,5-2 мл 1-2 раза в день во время еды;

6-12 лет по 2,5 мл 1-2 раза в день во время еды.

Курс приёма 1- 3 месяца или по рекомендации специалиста.

Противопоказания:

- Индивидуальная непереносимость к компонентам препарата;
- Дети до 2-х лет;
- Беременность и период лактации;
- Хроническая почечная недостаточность (ХПН) тяжелой степени;
- Гипотония;
- Совместное применение с препаратом леводопа.

Отпускается без рецепта.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С в сухом и в тёмном помещении.

Объём: 100 мл ± 2 мл

Не является лекарством.

Производитель: ООО ALKIMYOGAR FARM.

Республика Узбекистан, город Фергана, ул. Сайилгох 43

E-mail: info@alximik.uz Web: alximik.uz

Тел: +998 73 240 00 30 +998 99 401 30 00

НОРМОСТЕН

Упаковка: 100 мл флакон

Состав: наночастицы цинка - 25 мг/л, наночастицы магния - 35 мг/л, натуральные эфирные масла, дистиллированная вода.

Форма выпуска: коллоидный раствор.

Показания к применению:

- Иммунодефицитные состояния.
- Снижение обоняния и осязания, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, снижение перистальтики кишечника, дисбактериоз;
- Хронический колит, холецистит и панкреатит, запоры;
- Снижение выработки тестостерона и спермы, снижение половой функции.
- Простатит, бесплодие, геморрой.
- Гипогонадизм: отставание полового развития и роста;
- Катаракта, “куриная” слепота;
- Сахарный диабет 2 го типа;
- Поливалентная аллергия;
- Фурункулёз, угри, дерматит, экзема, псориаз, ожоги, микоз;
- Дизентерия, брюшной тиф, бруцеллёз, скарлатина, дифтерия;
- Спазмы мышц, судороги, атрофия мышц;
- Бессонница, депрессия, паника, мигрень;
- Способствует быстрому восстановлению воспаленных тканей кожи и слизистых оболочек;
- Болезни опорно-двигательного аппарата, полиартриты, артрозы, остеопороз, при ушибах и травм.

Способы применения и дозы:

Взрослые: по 5 мл 2 раза в день во время еды.

Дети: 2-6 года по 1,5-2 мл 1-2 раза в день во время еды;

6-12 лет по 2,5 мл 1-2 раза в день во время еды.

Курс приёма 1- 3 месяца или по рекомендации специалиста.

Противопоказания:

- Индивидуальная непереносимость к компонентам препарата;
- Дети до 2-х лет;
- Беременность и период лактации;
- Хроническая почечная недостаточность (ХПН) тяжелой степени;
- Гипотония;
- Совместное применение с препаратом леводопа.

Отпускается без рецепта.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С в сухом и в тёмном помещении.

Объём: 100 мл ± 2 мл

Не является лекарством.

Производитель: ООО ALKIMYOGAR FARM.

Республика Узбекистан, город Фергана, ул. Сайилгох 43

E-mail: info@alximik.uz Web: alximik.uz

Тел: +998 73 240 00 30 +998 99 401 30 00

